arXiv:1409.5722v1 [physics.ao-ph] 16 Sep 2014

Memorias de la Primera Escuela de Astroestadística: Métodos Bayesianos en Cosmología
9 al 13 Junio de 2014. Bogotá D.C., Colombia
Editor: Héctor J. Hortúa
Material suplementario

Alternativa de aplicación para la radiación de fondo en el desarrollo de la base de datos del atlas de radiación atmosférica

Alternative application for the radiation background in the development of the atlas database of atmospheric radiation

Ivan Arturo Morales De la Hoz [1]

Resumen

En la actualidad la radiación hace parte de las variables a considerar dentro del marco de los pronósticos ambientales y es significativa en el incremento del calentamiento global, sumado al efecto invernadero. La radiación que hoy en día contemplan los organismos meteorológicos dependen de la Referencia Radiométrica Mundial (WRR), el Grupo Mundial de Normalización (WSG), direccionada por el congreso de la Organización Meteorológica Mundial (O.M.M.). La presente investigación se basa en la radiación cósmica de fondo de microondas, como una variable a estimar para la toma de información de la radiación incidente en la atmosfera terrestre, con un aporte significativo en la construcción del atlas de radiación por parte de la (UPME) e (IDEAM). Debido a que por el momento se contemplan variables de radiación ultravioleta e infrarroja, columna de ozono, radiación directa y radiación difusa, las dos últimas resuelven la obtención de la radiación global, y se evalúan por parte de los organismos meteorológicos del país. El estudio de la radiación de fondo como proyecto de investigación arrojara datos que robustecerán los sistemas de información meteorológicos en Colombia, soportados a través de la metodología Bayesiana. Demostrando que la radiación cósmica de fondo puede llegar a contribuir notoriamente en el aumento en la variabilidad de la temperatura troposfera, estratosfera y mesosfera mundial por consecuencia del efecto invernadero.

Palabras clave: Atmósfera terrestre, efecto invernadero, radiación cósmica de fondo.

Abstract

Nowadays radiation is one of the variables to be considered in the environmental forecasting and it is meaningful in the increase of global warming, together green-

[1]Fundación Universitaria Los Libertadores Bogotá, Colombia. E-mail: iamoralesd@libertadores.edu.co

house effect. The radiation considered by the meteorological organizations depends on the World Radiometric Reference (WRR), the World Standard Group (WSG), addressed by the World Meteorological Organization (WMO). This work is based on the cosmic microwave background, as a variable to be estimated in order to get information about the incident radiation in the Earth's atmosphere, as a valuable and meaningful contribution in the building of the radiation atlas by the (UPME) and (IDEAM). Due to the fact that the variables considered are ultraviolet and infrared radiation, ozone column, direct radiation and diffuse radiation, the last two get the global radiation, and are the only ones to be evaluated by the national meteorological organizations in the country. The study of the cosmic background radiation as a research project will provide data which will strengthen the meteorological information systems in Colombia, supported by the Bayesian methodology; supporting that cosmic background radiation can contribute significantly in the increase of the variability of the troposphere, stratosphere and mesosphere world temperature as a consequence of global warming.

Keywords: Earth's atmosphere, greenhouse effect, cosmic background radiation.

1 Introducción

Los rayos cósmicos fueron descubiertos inesperadamente en 1912. Ahora se sabe que la mayoría de los rayos cósmicos son núcleos atómicos. La mayoría son núcleos de hidrógeno; algunos son núcleos de helio y elementos más pesados que el resto. Los cambios de abundancia relativa con la energía de los rayos cósmicos son los más altos de energía y tienden a ser núcleos más pesados. Aunque muchos de los rayos cósmicos de baja energía proviene de nuestro sol, el origen de los rayos cósmicos más energéticos sigue siendo desconocido y un tema de mucha investigación. Los rayos cósmicos pueden incluso ser importantes para el clima de la Tierra, como el rayo común que puede ser activado al pasar los rayos cósmicos, Nemiroff & Bonnett (2006).

En la figura 1, se muestra la superposición sobre las oscilaciones en la temperatura de


ANOMALÍA EN LA INTENSIDAD DE LOS RAYOS CÓSMICOS INTERGALÁCTICOS,
VARIABILIDAD EN LA TEMPERATURA TROPOSFÉRICA DEL HEMISFERIO NORTE
Y CONCENTRACIÓN DE CO2 ATMOSFÉRICO
ΔT Troposférica
Intensidad de los Rayos Cósmicos Intergalácticos
Intensidad de los Iones de He (con E>70 MeV/nucleón)
CO2 Atmosférico = [360-378 ppmv]
ΔT Troposférica HN (°C)
0.4
0.2
0
-0.2
2002
2002.5
2003
2003.5
2004
2004.5
2005
2005.5
Año del Calendario (EM)
Data Source: Intergalactic Cosmic Ray discovered by Voyager 1, credit NASA. ΔT by NOAA/NASA/JPL/GSFC. Stone et all. Voyager 1 Explores the Termination Shock Region and the Heliosheath Beyond. Science, Vol. 309, Issue 5743, 2017-2020, 23 September 2005. Graphs interpreted by Nasif Nahle © 25 October 2005.

Figura 1: Gráfico Crédito: E. C. Stone, et al. Voyager 1 explora el choque de terminación y la Región Heliosheat allá. Ciencia; Vol. 309, pp 2017-2020. 23 de septiembre 2005. NOAA.

la troposfera para compararla con la gráfica sobre la Intensidad de los rayos cósmicos (IRCI) que colisionan con el viento solar en los confines del Sistema Solar. Parece demostrar que existe una correlación directa entre las variaciones de la temperatura troposférica y la IRCI. Además, podría ser que la anomalía de la IRCI provoque las anomalías observadas en la actividad radiante de nuestro Sol, Stone et al. (2005).

2 La anomalía climática antártica y los rayos cósmicos galácticos

Se ha propuesto que los rayos cósmicos galácticos pueden influir en el clima terrestre afectando la formación de nubes. Si los cambios en la nubosidad desempeñan un papel en el cambio climático, su efecto cambia de signo en la Antártida. Datos

del satélite del Earth Radiation Budget Experiment (ERBE) se utilizan aquí para calcular los cambios en la temperatura de la superficie en todas las latitudes, debido a pequeños cambios porcentuales en la nubosidad. Los resultados coinciden con los contrastes observados en los cambios de temperatura, a nivel global y en la Antártida. Evidentemente las nubes no sólo responden pasivamente a los cambios climáticos, sino que toman parte activa en el forzamiento, de conformidad con los cambios en el campo magnético solar que varían el flujo de rayos cósmicos, Svensmark (2006).

3 Cosmoclimatología

Las nubes tienen un elevado albedo y ejercen su efecto de enfriamiento dispersando en el cosmos gran parte de la luz solar que de lo contrario podría calentar la superficie. Pero las nieves en las capas de hielo del Antártico son asombrosamente blancas, con un mayor albedo que las nubes. Allí, una cubierta de nubes extra calienta la superficie y menos nubosidad la enfría. Las mediciones por satélite muestran el efecto del calentamiento de nubes sobre la Antártida, y los meteorólogos en regiones meridionales lo confirman por observación. Groenlandia también tiene una capa de hielo, pero es más pequeña y no tan blanca. Y mientras que las condiciones en Groenlandia están acopladas al clima general del hemisferio norte, la Antártida está en gran medida aislada por torbellinos en el océano y en el aire. La hipótesis de los rayos cósmicos y forzamiento de las nubes, predice que los cambios de temperatura en la Antártida deben ser opuestos en signo a los cambios de temperatura en el resto del mundo. Esto es exactamente lo que se observa, en un fenómeno conocido que algunos geofísicos han llamado el sube y baja polar, para el que "la anomalía climática Antártica" parece un mejor nombre, Kirkby et al. (2011).

4 Rayos cósmicos y el clima de la Tierra

En la figura 2, hay una relación entre el enlace de los rayos cósmicos y la actividad solar para el clima terrestre. La actividad solar cambiante es responsable de la fuerza del viento solar que varía. Un viento más fuerte reducirá el flujo de rayos cósmicos que alcanzan la tierra, ya que una mayor cantidad de energía se pierde a medida que se propagan hasta el viento solar. Los mismos rayos cósmicos provienen desde afuera del sistema solar, lo más probable es que sean acelerados por remanentes de supernova. Dado que los rayos cósmicos dominan la ionización troposférica, un aumento de la actividad solar se traducirá en una reducción de la ionización, como también para una nube reducida de baja altitud. Dado que las nubes de baja altitud tienen un efecto neto de enfriamiento (su "blancura" es más importante que su efecto "manta"), el aumento de la actividad solar implica un clima más cálido. Las variaciones del flujo de rayos cósmicos tienen un efecto similar, que no están relacionadas con las variaciones de la actividad solar. En la figura 2, se ve claramente cómo la Intensidad de la Radiación Cósmica intergaláctica influye en la temperatura troposférica terrestre. Cuando el viento solar choca con la radiación cósmica Intergaláctica, los nucleones y el plasma de electrones del viento solar se calientan y disminuyen su velocidad de desplazamiento hacia afuera del Sistema Solar. En la terminación de choque, los elec-



Figura 2: Temperatura en la troposfera y rayos cósmicos intergalácticos. Gráfico Crédito: E. C. Stone, et al. Voyager 1 explora.

trones y nucleones de la radiación cósmica Interestelar penetran contracorriente por las ondas del viento solar y son desviados por la turbulencia magnética que produce el movimiento del Sistema Solar desplazándose hacia la terminación de choque. Los nucleones intergalácticos con baja densidad de energía no penetran el Sistema Solar sino que son desviados por los turbulencias magnéticas (Arco de Choque) que se forman por el impacto entre el Viento Solar y la RCI; sin embargo, las partículas lentas con alta densidad de energía (partículas calientes) remontan el viento Solar contra corriente, ellas se enfrían de nuevo, y entonces aceleraran hasta alcanzar velocidades supersónicas que alcanzan los 400 km/s viajando hacia el sol, es decir, en dirección opuesta hacia la cual el Viento Solar fluye. La RCI y las partículas aceleradas golpean contra el Campo Magnético Terrestre (CMT). La colisión de esas partículas del arco de choque que colisionan en el CMT promueve la formación de nubes cuando penetran en la troposfera de la Tierra. Las partículas de la RCI entrantes que inciden sobre la superficie de la Tierra incrementan la temperatura del suelo y de los océanos. El calor de la superficie se transfiere a la troposfera baja y ésta se calienta. La intensidad de las partículas intergalácticas y de la radiación cósmica que afectan a la Tierra depende de la intensidad del Viento Solar. Si la intensidad del Viento Solar es alta, entonces la RCI entrante desde el arco de choque del Sistema Solar sería más alta también. Si el Viento Solar disminuye su velocidad, la RCI que remontó el viento Solar contra corriente no disminuye su velocidad; sin embargo, las partículas de la RCI no se desvían, aunque ingresan a la Tierra, en donde transfieren su energía a las moléculas del suelo y los océanos, calentándolos de forma extraordinaria. Si la actividad solar es intensa, entonces el flujo del plasma cósmico será mayor, Stone et al. (2005). La terminación de choque, o margen de Choque, es la región del Sistema Solar en donde las emisiones solares colisionan contra los rayos cósmicos Intergalácticos. Junto con la radiación del Sol, esta es la verdadera causa del Calentamiento Global y ha ocurrido

cíclicamente durante toda la historia de nuestro planeta; algunas veces muy intensamente y en otras mucho menos. Sería muy poca la diferencia (un 3% cuando mucho) si tuviésemos la mitad de los gases de Invernadero en nuestra atmosfera. De acuerdo con las gráficas incluidas arriba, en este momento estamos pasando por un período de excesivamente alta actividad, tanto solar como Intergaláctica. Los pronósticos no son muy buenos, pues estamos recibiendo toda la energía y los nucleones que se aceleraron, de tal forma que la temperatura troposférica terrestre continuará ascendiendo. No sabemos hasta cuándo ni cuánto; sin embargo, este ciclo terminará y probablemente seguirá otro ciclo de enfriamiento global, el cual podría convertir una vez más a la Tierra en una bola de nieve, Stone et al. (2005).

5 Proyecto CLOUD

El experimento CLOUD Duplissy et al. (2010), realizado en el CERN en Ginebra, consiste en una cámara de acero inoxidable de 3m de diámetro que contiene aire ultra puro humidificado y trazas de gases seleccionados, se coloca en la trayectoria de haces de piones que simula los rayos cósmicos ionizantes. Los investigadores que participan en la colaboración de la CLOUD, han dado a conocer los primeros resultados de su experimento, ha sido diseñado para imitar las condiciones de la atmósfera de la Tierra. Su funcionamiento radica en la disipación de haces de partículas de sincrotrón por medio del acelerador de protones cuya cámara se encuentra llena de gas, han descubierto que los rayos cósmicos podrían tener un papel determinante en el clima, en particular, en la producción de aerosoles que potencialmente define la siembra de nubes. Hay un gran debate sobre el posible papel de los rayos cósmicos en la formación de estos aerosoles. Henrik Svensmark, del Instituto Nacional del Espacio en Copenhague y sus colegas, postulan la hipótesis de que los iones cargados se forman como rayos cósmicos que a su vez atraviesan la atmósfera y actúan como una especie de pegamento, esto hace que sea más fácil para las moléculas unirse y formar aerosoles. Esta hipótesis ha sido objeto de controversia, ya que sugiere un papel para la variación de la radiación solar, así como las emisiones humanas de gases de efecto invernadero y el cambio climático, Duplissy et al. (2010). Para la colaboración de la investigación en el proyecto CLOUD, un grupo internacional liderado por Jasper Kirkby donde hace parte del proyecto CERN. El experimento, que ha estado funcionando desde finales de 2009, indica que cuando se simula la atmósfera en sólo un kilómetro sobre la superficie de la Tierra, el ácido sulfúrico, agua y amoníaco, crecen en sus componentes para iniciar la producción de aerosoles. Sin embago, las observaciones aseguran que dichas componentes no son suficientes para generar los aerosoles. Estos valores están por debajo de un factor de hasta mil, incluso cuando los piones están presentes. Por ello, llegaron a la conclusión de que otras moléculas también deben desempeñar un papel, en forma de compuestos orgánicos.

Como explica Kirkby, si la sustancia que falta es causada por el hombre, entonces la contaminación humana podría estar teniendo un efecto de enfriamiento más grande del que se cree en la actualidad (las emisiones de dióxido sulfúrico son ya conocidas, a través de las cuales generan el ácido sulfúrico, que es vital para la producción de aerosoles). De lo contrario, dice Kirkby, si la sustancia faltante proviene de una fuente

natural, el hallazgo podría implicar la existencia de un nuevo mecanismo de retroalimentación climática (posiblemente, las temperaturas más altas ante el aumento de las emisiones orgánicas de los árboles). Sin embargo, cuando se simula la atmósfera superior, los investigadores encontraron un efecto de rayos cósmicos más fuerte. Ellos descubrieron que a altitudes de 5 km o más, donde las temperaturas están por debajo de -25 ^{0}C, el ácido sulfúrico y el agua pueden forman fácilmente aerosoles estables, de unos pocos nanómetros de diámetro y que los rayos cósmicos puede aumentar la tasa de producción de aerosol en un factor de 10 o más, Duplissy et al. (2010).


Acum Rad Solar con TX cada 2 minutos
Precipitacion con TX cada 2 minutos
Temperatura Aire 2m TX cada 2 minuto
Velocidad Viento TX cada 2 minutos
Direccion Viento con TX cada 2 minutos
Humedad aire 2m TX cada 2 minutos
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
[1m]

Figura 3: Graficas suministradas por el departamento de Meteorología y automatización, IDEAM (2005).

6 Mediciones en Colombia

A lo amplio de la extensión del territorio Colombiano existe entidades de carácter privado y oficial que monitorean las variables medioambientales; dentro de ellas está el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), que cuenta con una red de aproximadamente 3000 estaciones (hidrológicas y meteorológicas entre convencionales y automáticas), instaladas en diferentes regiones del país para medir temperatura, humedad, viento, radiación solar, lluvias, niveles de ríos, entre otros, las cuales son operadas a través de 11 sedes en el país: Medellín, Santa Marta, Villavicencio, Neiva, Barranquilla, Duitama, Pasto, Bucaramanga, Cali, Ibagué y Bogotá sumado a estaciones donde se localizan plataformas de lanzamiento de globos aerostáticos. El IDEAM es la entidad nacional encargada de analizar y cuantificar los gases de efecto invernadero (GEI). El IDEAM suministra información hidrológica y meteorológica que contribuye a garantizar la seguridad aérea en el país. Hacia 1850 las zonas nevadas que hoy se conocen contaban con un área glaciar de 349 km^2, área que a la fecha se redujo en cerca de 90% especialmente durante los últimos 20 años, quedando en cerca de 45.3 km^2. Colombia en cerca de 40 años ya no tendría nevados. Con datos generados a finales de 2012, cuenta con cerca de $45.3km^2$ de masa glaciar distribuida en seis nevados. Cabe destacar que la temperatura aumenta en promedio 0.12^0C por década. El IDEAM adelantó un proyecto con excelentes resultados para la recuperación de masas glaciares en el país. Instaló una valla interceptora de nieve en el Nevado de Sana Isabel, con el fin de acumular nieve en zonas severamente afectadas por el deshielo, Morales-Betancourt (2014). La presencia del IDEAM en temas de conservación estrategias de formación y sensibilización, gesta proyectos que en cierta medida logran mitigar el impacto social y ambiental ante el cambio climático, como poner en marcha junto con el gobierno Colombiano el Proyecto Piloto Nacional de Adaptación al Cambio Climático (INAP). En las figuras 3, 4 y 5, se muestran los histogramas del año 2013-2014, variables meteorológicas recolectadas por el globo aerostático, por parte del (IDEAM). En las figuras 6 y 7 se muestran los histogramas del primer semestre año de 2014.

Al correlacionar los datos de cada una de las variables sea de radiación con precipitación, radiación con temperatura, temperatura con presión, temperatura con velocidad del viento, obtendremos comportamientos dinámicos de los fluidos naturales, herramientas que ayudan para originar modelos estadísticos que convergen en un dato final de pronóstico ambiental.

En las anteriores graficas se observan los datos recolectados en una zona específica (aeropuerto el dorado) que hace parte de una estación, para la construcción del atlas de radiación por parte de (UPME) e (IDEAM). Cabe resaltar que se requiere información de todas las estaciones que se encuentran distribuidas a lo amplio del territorio nacional, labor que en el momento se está realizando; la gesta de este proyecto suministrará información relevante para el medio ambiente nacional y en consecuencia global, ya que contribuye al conocimiento de la disponibilidad de los recursos renovables e identifica las regiones estratégicas donde es más adecuada la utilización de la energía solar. Con esto se podría dar solución de necesidades energéticas; a su vez aporta repercusiones sobre la vida humana, los ecosistemas y los materiales, al contribuir



Figura 4: Graficas suministradas por el departamento de Meteorología y automatización, IDEAM (2005).

elementos para prevenir sobre los efectos nocivos de la radiación terrestre, resultados semejantes los podemos apreciar hoy ante la anterior creación del atlas solar de 2005 en apoyo de la información de textos y modelos del atlas solar de 1993. La radiación electromagnética proveniente del sol se propaga radialmente en el espacio vacio; su intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia, y su comportamiento se describe empleando las ecuaciones de Maxwell de la teoría electromagnética o mediante la teoría quántica y relativista IDEAM (2005). La obtención del dato de radiación solar global, se realiza a través del dataloger que recolecta la información de las mediciones que registra los instrumentos pirheliómetro y el piranómetro. Estos datos se operan por medio de métodos estadísticos como lo son la correlación o regresión lineal y se interpolan para generar las curvas de calibración, por normalización el instrumento patrón nacional es el pirheliómetro y es el referente para la calibración del piranómetro. Para la información que se logre obtener ante la actual alternativa de aplicación para la radiación de fondo en la radiación atmosférica, se operarían con una función de correlación donde la variable de radiación global se determina de manera normalizada como se viene trabajando y la variable de radiación de fondo se operara bajo procesos gaussianos, que define la convergencia del dato, para posteriormente conseguir una curva teórica bajo un modelo de correlación con los valores de los datos observados; y de este modo obtener el pronóstico de la radiación atmosférica.

Así como lo fue para el atlas de radiación solar del 2005 como para el de hoy en día, se conto con la participación de la comunidad científica resaltando la labor del profesor e Ingeniero Geógrafo Simbaqueva Fonseca Ovidio que actualmente se encuentra liderando procesos de investigación solar en los laboratorios de la Universidad Los Libertadores con la cooperación del profesor Ing. Mecánico M. Sc. Paguatian Edisson Hernando, IDEAM (2005).

En la figura 7 se muestra un diagrama donde se puede observan detalladamente


Acum Rad Solar con TX cada 2 minutos
Precipitacion con TX cada 2 minutos
Temperatura Aire 2m TX cada 2 minuto
Velocidad Viento TX cada 2 minutos
Direccion Viento con TX cada 2 minutos
Humedad aire 2m TX cada 2 minutos
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
01/01/2014
01/01/2015
[1m]

Figura 5: Graficas suministradas por el departamento de Meteorología y automatización, IDEAM (2005).

cada uno de los procesos para la recopilación de información desarrollados para el atlas de radiación de 2005 (UPME) e (IDEAM). Finalmente, el Ministerio del Medio Ambiente (2001) también ha formulado un programa para el manejo sostenible y restauración de ecosistemas de la alta montaña colombiana en el que se proponen diversas formas de investigación, conservación y recuperación de los pasajes y ecosistemas paramunos a través de la participación activa de la colectividad científica y de las poblaciones locales y residentes en las áreas problemáticas, así como también a través de la integración de ecorregiones estratégicas a través de trabajos conjuntos entre diversos países, ver el artículo Morales-Betancourt (2014) para mayor información.



Figura 6: Graficas suministradas por el departamento de Meteorología y automatización, IDEAM (2005).


Recopilación de Información
Piranometría y digitalización, 39 puntos
Radiación global medida, 32 puntos
Brillo solar, 383 puntos
Humedad relativa
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Radiación UV, 5 puntos
Imagen satélite radar de columna de ozono, 280 puntos
Procesamiento en hojas electrónicas, evaluación de la base de datos, análisis en Series de Fourier de cada variable, complemento estadístico (relleno) de series y establecimiento del año tipo
Radiación solar medida, 71 puntos
Mapas de brillo solar, 479 puntos
Brillo solar infrarrojo, 96 puntos
Modelo de interacción radiación atmósfera Ley de Lambert Beer
Modelo de Ångström modificado, 511 puntos
R305 nm
R320 nm
R340 nm
Índice UV, 280 puntos
Mapas de radiación solar global, 550 puntos
Mapas de radiación UV, 280 puntos
Mapas de ozono, 280 puntos

Figura 1.1. Flujograma de ejecución del proyecto

Figura 7: Recolección de información para la construcción del atlas solar. Figura tomada de Atlas de radiación solar de Colombia (UPME) e (IDEAM), 2005.

7 Conclusiones

En este artículo se presentó el Atlas de radiación de (UPME) e (IDEAM). En la formulación estadística se contempla la mayor cantidad de las variables posibles que inciden en el sistema; para resolver con las magnitudes escalares existentes la variable indeterminada y la distribución de probabilidad y así la incertidumbre que en nuestro

caso es el valor de radiación terrestre. Podemos concluir que la información (muestreo) requiere del dato de radiación de fondo con su respectivo intervalo de confianza, con la finalidad de poder correlacionarlo con las variables que actualmente se trabajan y así originar los modelos estadísticos que convergen en un dato final de pronóstico ambiental.

Basado en los estudios encaminados a la radiación de fondo y su potencial importancia en términos ambientales se logra inferir, que para la creación del mapa de radiación de (UPME) e (IDEAM) se puede emplear una metodología que cuente con un programa de investigación de radiación de fondo terrestre, donde se incluya los métodos bayesianos, identificando el modelo correcto para la gesta de este proyecto de investigación que suministrara información relevante para el medio ambiente nacional y en consecuencia global, ya que contribuirá al conocimiento de la disponibilidad de los recursos renovables e identificara las regiones estratégicas donde es más adecuada la utilización de la energía solar, para la solución de necesidades energéticas; a su vez aportara el nivel de repercusiones sobre la vida humana, los ecosistemas y los materiales, al contribuir elementos para prevenir sobre los efectos nocivos de la radiación terrestre.

Bibliografía

J. Duplissy, et al. (2010). 'Results from the CERN pilot CLOUD experiment'. *Atmospheric Chemistry and Physics* **10**(4):1635–1647.

IDEAM (2005). 'Preliminares del atlas de radiación solar de Colombia'. *base de datos del IDEAM* **Apéndice A**(4):115.

J. Kirkby, et al. (2011). 'Role of sulphuric acid, ammonia and galactic cosmic rays in atmospheric aerosol nucleation'. *Nature* **476**(5743):429–433.

D. A. Morales-Betancourt (2014). 'EL PÁRAMO: ECOSISTEMA EN VÍA DE EXTINCIÓN?'. *Revista Científica Universidad de Caldas* .

R. Nemiroff & J. Bonnett (2006). 'NASA Web Site Statements'. A service of: EUD at NASA, GSFC & Michigan Tech. U.

E. C. Stone, et al. (2005). 'Voyager 1 Explores the Termination Shock Region and the Heliosheath Beyond'. *Science* **309**(5743):2017–2020.

H. Svensmark (2006). 'The Antarctic climate anomaly and galactic cosmic rays'. *ArXiv Physics e-prints 0612145* .